

CIRURGIA DE AMBULATÓRIO

No dia seguinte à cirurgia, a equipa de enfermagem telefonará para saber do seu estado de saúde e para esclarecer todas as dúvidas que ainda possam existir.

CONTACTOS:

Dias úteis (08h às 22h)

Unidade de Cirurgia de Ambulatório - HPV

Tel.: 217 548 266

Dias úteis (22h às 08h)

Tel.: 925 422 874

Fins de semana e feriados

Tel.: 217 805 000 Ext.: 96260

Email:

secretariado.uca2@chln.min-saude.pt

Morada:

Alameda das Linhas de Torres,117

1769-001 Lisboa



CHULN, EPE


Unidade de Cirurgia
de **Ambulatório**

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE



UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE
HOSPITAL PULIDO VALENTE

TRATAMENTO DO Freio Peniano Curto



DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Médico Assistente: _____

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE



O QUE É O FREIO PENIANO CURTO?



É uma patologia caracterizada por um freio peniano de comprimento curto em relação à glande e ao prepúcio, impossibilitando uma adequada retração do prepúcio em relação à glande.

O QUE CAUSA O FREIO PENIANO CURTO?

O freio peniano curto é causado por um desadequado desenvolvimento desta estrutura em relação à glande e ao prepúcio, seja antes do nascimento ou mesmo durante o desenvolvimento sexual secundário da puberdade. Pode ainda ser causado por condições que condicionem inflamação local (p.e. infecção da glande do pénis) ou outro tipo de condições que levem a formação de tecido cicatricial nesta zona.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

O freio peniano curto na maioria dos casos é assintomático, mas pode levar ao aparecimento de dor durante o acto sexual ou até mesmo a laceração traumática do freio durante o acto sexual.

QUAL O TRATAMENTO DISPONÍVEL?

Existem tratamentos não cirúrgicos para esta patologia, como cremes com corticosteróides ou outros agentes tópicos, sendo o seu sucesso limitado. O tratamento definitivo é cirúrgico, podendo ser realizada uma frenuloplastia (corte do freio) possibilitando dessa maneira a retracção normal do prepúcio.


TRATAMENTO DO Freio Peniano Curto

CUIDADOS A TER NO DOMICÍLIO APÓS A FRENULOPLASTIA

Deve utilizar roupa interior tipo “slip”, com a ponta do pénis apontada para cima ou uma cinta suspensória do pénis, de modo a evitar a formação de edema ou hematoma.

Deve manter bons cuidados de higiene da região genital, lavando a zona com água e sabão pelo menos uma a duas vezes por dia, com o cuidado de a secar devidamente após cada lavagem.

Deve evitar ter relações sexuais num período de 4 a 6 semanas, de modo a permitir uma correcta cicatrização dos tecidos.





Dia da Cirurgia

TRATAMENTO DO Freio Peniano Curto

Primeiras 24h

Deve:

- » Comparecer na hora indicada de acordo com o agendamento da sua cirurgia
- » Estar em jejum
- » Trazer exames recentes
- » Trazer uma lista dos medicamentos que toma habitualmente
- » Remover o verniz das unhas/piercings

Não deve:

- » Comer nem beber, nem mesmo água a partir da meia-noite
- » Trazer objetos de valor

Nota importante:

Se nos dias anteriores à cirurgia apresentar tosse, expetoração, febre, diarreia ou vómitos, deve contactar o Departamento de Cirurgia Geral (HSM), pois poderá não ter condições operatórias.

Telefone: 217 805 000 (ext. 55558)

Pode acontecer e é considerado normal:

- » Dor moderada no local da cirurgia
- » Penso no local operado com pequeno repasso de sangue

Contactar o seu médico se:

- » Sentir dor intensa no local da cirurgia
- » Penso no local operado apresentar repasso de líquido purulento e/ou sangue
- » Febre (>38°C)
- » Náuseas e/ou vómitos frequentes

Sequimento

- » Será avaliado na Consulta de Cirurgia do HSM na primeira semana após a cirurgia
- » Ser-lhe-á fornecida toda a informação relacionada com as consultas posteriores, medicação e outras informações para o período após cirurgia