



CONTACTAR O SEU MÉDICO SE:

» **DOR INTENSA**
e que não cede à medicação prescrita

» **HEMORRAGIA** incontrolável

» **FEBRE** (>38°C)

» **NÁUSEAS E/OU VÓMITOS**
frequentes

» **SERÁ AVALIADO** na consulta de estomatologia do HSM **NO PRAZO DE 1 A 2 SEMANAS APÓS A CIRURGIA**

CONTACTOS

SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA (HSM)

Dias úteis (08-20h)

Tel.: 217 805 000 Ext.: 52105

Tel.: 217 805 105 (linha direta)

MORADA

Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa

LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Piso 01 - Elevador 11

UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO (HPV)

Dias úteis (08h às 22h)

Unidade de Cirurgia de Ambulatório - HPV

Tel.: 217 548 266

EMAIL

secretariado.uca2@chln.min-saude.pt

MORADA

Alameda das Linhas de Torres, 117
1769-001 Lisboa



CHULN, EPE

Unidade de Cirurgia
de **Ambulatório**

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE



Av. Prof. Egas Moniz – 1649-035 Lisboa
Telefone: 21 780 50 00
contactcenter@hsm.min-saude.pt
www.chln.min-saude.pt



CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE, EPE



CIRURGIA DE AMBULATÓRIO
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE

TRATAMENTO QUISTOS DOS MAXILARES



SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA

Médico Assistente: _____


TRATAMENTO QUISTOS DOS MAXILARES



Os **quistos dos maxilares** são lesões benignas que podem ter diferentes causas e afetam doentes de qualquer idade e género. **Estes têm habitualmente uma evolução lenta.**

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é efetuado com recurso a exames de imagem, nomeadamente Ortopantomografia (RX panorâmico).



CAUSAS

Podem ter diferentes causas, sendo as mais comuns, cáries dentárias e dentes inclusos.

SINTOMAS

Na maioria dos casos, não há sintomas associados, no entanto pode ocorrer inchaço na cavidade oral, abscesso com drenagem de pus, mobilidade de peças dentárias ou dor.

TRATAMENTO

CIRÚRGICO. A cirurgia de remoção do quisto pode ser precedida de uma pequena cirurgia sob anestesia local em que se faz uma descompressão do quisto e uma biópsia para se identificar o tipo de quisto. Posteriormente procede-se à cirurgia para remoção do quisto. A remoção do quisto é feita com recurso a incisões intra-orais (sem cicatrizes na pele).

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

- › Complicações associadas ao procedimento anestésico
- › Hemorragia pós-operatória
- › Infecção
- › Inchaço
- › Limitação da abertura da boca

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

- › Alimentos moles e frios
- › Cabeceira elevada
- › Gelo local
- › Não fazer esforços físicos
- › Não assoar o nariz/espirrar
- › Fazer medicação prescrita

PRIMEIRAS 24 HORAS

PODE ACONTECER E É CONSIDERADO NORMAL

- › Dor moderada no local da cirurgia
- › Inchaço
- › Hemorragia ligeira
- › Limitação da abertura da boca